

**1. а) Лемма о трёх хордах.** Данна функция  $f$ , выпуклая на интервале  $(a, b)$ . Докажите, что для любых  $x, y, z \in (a, b)$  таких, что  $z < y < x$ , верно

$$\frac{f(y) - f(z)}{y - z} \leqslant \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leqslant \frac{f(x) - f(y)}{x - y}.$$

**6)** Пусть  $x, y, z, t \in [a, b]$ ,  $x \geqslant y \geqslant z \geqslant t$  и  $x + t = y + z$ . Докажите, что тогда  $f(x) + f(t) \geqslant f(y) + f(z)$ .

**Определение.** Пусть  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  и  $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  — невозрастающие наборы действительных чисел (т.е.  $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \dots \geqslant x_n$  и  $y_1 \geqslant y_2 \geqslant \dots \geqslant y_n$ ). Набор  $X$  *мажсорирует* набор  $Y$  (пишут " $X \succ Y$ " или " $Y \prec X$ "), если выполнены следующие условия: 1)  $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$ ; 2) для всех  $1 \leqslant k \leqslant n$  верно  $\sum_{i=1}^k x_i \geqslant \sum_{i=1}^k y_i$ .

**2. а)** Пусть  $X \succ Y$ . Докажите, что набор  $Y$  может быть получен из набора  $X$  при помощи конечной последовательности следующих операций: числа  $x_i$  и  $x_j$  ( $x_i > x_j$ ) заменяются на числа  $x_i - d$  и  $x_j + d$ , где  $d$  — положительное число такое, что при указанной замене не нарушается неубывающий порядок (т.е.  $x_i > x_i - d \geqslant x_{i+1}, x_{j-1} \geqslant x_j + d > x_j$  и  $x_i - d \geqslant x_j + d$ ).

**6) Неравенство Караматы.** Пусть  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  — выпуклая функция,  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in [a, b]$  и  $X = (x_1, \dots, x_n) \succ Y = (y_1, \dots, y_n)$ . Докажите, что

$$f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n) \geqslant f(y_1) + f(y_2) + \dots + f(y_n).$$

Для вогнутой функции выполнено аналогичное неравенство со знаком  $\leqslant$ .

**3.** Пусть  $a, b$  и  $c$  — длины сторон треугольника. Докажите неравенство

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leqslant \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}.$$

**4.** Пусть  $x_1, \dots, x_n \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}]$ . Докажите, что

$$\cos(2x_1 - x_2) + \dots + \cos(2x_n - x_1) \leqslant \cos x_1 + \dots + \cos x_n.$$

**5. Неравенство Сегё.** Пусть  $\phi(x)$  — выпуклая функция и  $a_1 \geqslant \dots \geqslant a_{2n-1} \geqslant 0$ . Докажите, что  $\phi(a_1) - \phi(a_2) + \phi(a_3) - \dots + \phi(a_{2n-1}) \geqslant \phi(a_1 - a_2 + a_3 - \dots + a_{2n-1})$ .

**6.** Пусть  $a, b, c > 0$ . Докажите, что  $a^3 + b^3 + c^3 + abc \geqslant \frac{2}{3}(a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2)$ .

**7.** Пусть  $a, b, c, d > 0$ . Докажите, что

$$a^4 + b^4 + c^4 + d^4 + 2abcd \geqslant a^2b^2 + b^2c^2 + c^2d^2 + d^2a^2 + a^2c^2 + b^2d^2.$$

**8.** Пусть  $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ . Докажите, что

$$(1 + \frac{a_1^2}{a_2})(1 + \frac{a_2^2}{a_3}) \dots (1 + \frac{a_n^2}{a_1}) \geqslant (1 + a_1)(1 + a_2) \dots (1 + a_n).$$

**1. а) Лемма о трёх хордах.** Данна функция  $f$ , выпуклая на интервале  $(a, b)$ . Докажите, что для любых  $x, y, z \in (a, b)$  таких, что  $z < y < x$ , верно

$$\frac{f(y) - f(z)}{y - z} \leqslant \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leqslant \frac{f(x) - f(y)}{x - y}.$$

**6)** Пусть  $x, y, z, t \in [a, b]$ ,  $x \geqslant y \geqslant z \geqslant t$  и  $x + t = y + z$ . Докажите, что тогда  $f(x) + f(t) \geqslant f(y) + f(z)$ .

**Определение.** Пусть  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  и  $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$  — невозрастающие наборы действительных чисел (т.е.  $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \dots \geqslant x_n$  и  $y_1 \geqslant y_2 \geqslant \dots \geqslant y_n$ ). Набор  $X$  *мажсорирует* набор  $Y$  (пишут " $X \succ Y$ " или " $Y \prec X$ "), если выполнены следующие условия: 1)  $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$ ; 2) для всех  $1 \leqslant k \leqslant n$  верно  $\sum_{i=1}^k x_i \geqslant \sum_{i=1}^k y_i$ .

**2. а)** Пусть  $X \succ Y$ . Докажите, что набор  $Y$  может быть получен из набора  $X$  при помощи конечной последовательности следующих операций: числа  $x_i$  и  $x_j$  ( $x_i > x_j$ ) заменяются на числа  $x_i - d$  и  $x_j + d$ , где  $d$  — положительное число такое, что при указанной замене не нарушается неубывающий порядок (т.е.  $x_i > x_i - d \geqslant x_{i+1}, x_{j-1} \geqslant x_j + d > x_j$  и  $x_i - d \geqslant x_j + d$ ).

**6) Неравенство Караматы.** Пусть  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  — выпуклая функция,  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in [a, b]$  и  $X = (x_1, \dots, x_n) \succ Y = (y_1, \dots, y_n)$ . Докажите, что

$$f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n) \geqslant f(y_1) + f(y_2) + \dots + f(y_n).$$

Для вогнутой функции выполнено аналогичное неравенство со знаком  $\leqslant$ .

**3.** Пусть  $a, b$  и  $c$  — длины сторон треугольника. Докажите неравенство

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leqslant \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}.$$

**4.** Пусть  $x_1, \dots, x_n \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}]$ . Докажите, что

$$\cos(2x_1 - x_2) + \dots + \cos(2x_n - x_1) \leqslant \cos x_1 + \dots + \cos x_n.$$

**5. Неравенство Сегё.** Пусть  $\phi(x)$  — выпуклая функция и  $a_1 \geqslant \dots \geqslant a_{2n-1} \geqslant 0$ . Докажите, что  $\phi(a_1) - \phi(a_2) + \phi(a_3) - \dots + \phi(a_{2n-1}) \geqslant \phi(a_1 - a_2 + a_3 - \dots + a_{2n-1})$ .

**6.** Пусть  $a, b, c > 0$ . Докажите, что  $a^3 + b^3 + c^3 + abc \geqslant \frac{2}{3}(a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2)$ .

**7.** Пусть  $a, b, c, d > 0$ . Докажите, что

$$a^4 + b^4 + c^4 + d^4 + 2abcd \geqslant a^2b^2 + b^2c^2 + c^2d^2 + d^2a^2 + a^2c^2 + b^2d^2.$$

**8.** Пусть  $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ . Докажите, что

$$(1 + \frac{a_1^2}{a_2})(1 + \frac{a_2^2}{a_3}) \dots (1 + \frac{a_n^2}{a_1}) \geqslant (1 + a_1)(1 + a_2) \dots (1 + a_n).$$